



Difendiamoci dalle zanzare 2

Impedire la riproduzione delle zanzare

Per evitare di creare situazioni favorevoli alla riproduzione delle zanzare è **fondamentale la collaborazione di tutti i cittadini**. Ecco cosa ognuno di noi può fare per contenere il problema:

- **svuotare o ricambiare l'acqua** di ogni contenitore (secchi, annaffiatori, sottovasi e simili, vaschette della condensa) almeno una volta alla settimana anche nei cimiteri; se non è possibile farlo, coprire i contenitori con una zanzariera o usare prodotti alternativi per i fiori (es. argilla espansa);
- **evitare l'accatastamento o l'abbandono di contenitori** (copertoni, teli in plastica ed altri oggetti) che per la loro forma consentono accumuli d'acqua piovana, anche piccoli;
- **irrigare orti e giardini** senza creare ristagni;
- **mantenere il giardino pulito** ed ordinato eliminando gli eventuali sedimenti fangosi; **le siepi** possono essere trattate con prodotti abbattenti da fine giugno;**(1)**
- **controllare che le grondaie** non siano otturate e siano mantenute in efficienza;
- **svuotare e sostituire spesso l'acqua** di fontane o vasche ornamentali e inserire pesci che si nutrono di larve; sostituire spesso l'acqua degli abbeveratoi e ciotole per animali;
- **tenere puliti i tombini e caditoie** presenti negli spazi privati e mettere in essi prodotti di sicura efficacia larvicida e a basso impatto ambientale **(2)**. Questi prodotti sono acquistabili in commerciali agricole, negozi di fiori, consorzi agrari in alcuni supermercati e centri commerciali;
- **tenere sfalciati e puliti i fossati e le canalette private** in modo che il deflusso dell'acqua sia costante e senza ristagni. Segnalare al comune eventuali ristagni in scoli comunali o consortili.

(1) in caso di elevate infestazioni si possono applicare sulle siepi fino ad un'altezza max di 3 metri prodotti a base di piretroidi seguendo scrupolosamente le indicazioni riportate in etichetta usando protezioni personali (guanti, mascherina, occhiali o visiera). Tali prodotti sono reperibili presso commerciali agricole e grossi centri commerciali

(2)

<i>Principio attivo</i>	<i>Nomi commerciali (a titolo di esempio)</i>	<i>formulazione consigliabile</i>	<i>applicazione</i>
Diflubenzuron	FLUBEX	compresse	1 compressa per caditoia ogni 3-4 settimane (*)
Pyriproxyfen	PROXILAR, TIGREX, AQUA-LARV,	compresse	1 compressa per caditoia ogni 3-4 settimane (*)
B. Thuringiensis	VECTOBAC DT	tavolette	1 tav. per caditoia ogni 7 giorni (*)

(*) la frequenza dipende dalle condizioni atmosferiche (temperatura e piogge); in caso di precipitazioni molto abbondanti ripetere il trattamento